

Index:

ENTO	ALT-MESO
NEU-MESO	EKTO

# „Augen“

Phase im SBS Gewebe	1. Augenbestandteile					
	Konfliktinhalt	CA	pCI-A	Krise	pCI-B	Normotonie
Ektoderm <b>Bindehaut (Konjunktiva)</b>	Leichter visueller Trennungskonflikt, „den Menschen aus den Augen verloren haben“	Zell – Taubheit	Zell + Schwellung → Bindehautentzündung (Konjunktivitis) Überempfindlichkeit → Syndrom: Flügelfell (Pterygium)		Zell + Überempfindlichkeit → Juckreiz	Vernarbungen
Neu-Mesoderm <b>Lymphfollikel der Bindehaut</b>	Selbstwerteinbruch, die Bindehaut betreffend, „da ist etwas nicht in Ordnung“	Zell –	Zell + Schwellung		Zell +	Rezidive: bleibende Erhabenheit
Ektoderm <b>Hornhaut (Kornea)</b>	Stärkerer visueller Trennungskonflikt, „nicht beeindrucken können“, „nicht so von anderen gesehen werden wollen“	Zell – → Hornhautgeschwür Taubheit	Zell + Überempfindlichkeit Schwellung → evtl. Hornhauttrübung (mechanisch, wenn Oberlid rau)		Zell + Überempfindlichkeit → Juckreiz	Rezidive: Hornhautverkrümmung mit Astigmatismus (Brennpunktunschärfe)
Entoderm <b>Glatte Muskulatur der Iris</b>	Mehr oder weniger Licht einfangen (rechts) bzw. vermeiden (links) wollen	Zell + Mehrfunktion der Peristaltik des M. sphincter pupillae → Augenzittern (Nystagmus)	Zell – → Iristuberkulose mit -spaltung (Kolobom) Unterfunktion → Pupillenstarre (Pupillotonie)	Mehrfunktion	Zell – → Iristuberkulose Wiederaufnahme der Funktion	

<b>Ektoderm</b> <b>Augenlinse</b>	Sehr starker visueller Trennungskonflikt	Zell – Taubheit	Zell + Schwellung → Linsentrübung (Cataract = „Grauer Star“) Überempfindlichkeit		Zell + Überempfindlichkeit	
<b>Ektoderm</b> <b>Glaskörper (Corpus vitreum)</b>	Angst-im-Nacken vor einer Person, einem Verfolger oder einem Tier	Partielle Trübung des Glaskörpers, emotionaler Druck von hinten	Rückgang der Trübung mit Glaskörper-Ödem (eine Form des Glaukoms)		Normalisierung	
<b>Ektoderm</b> <b>Netzhaut-hälften (Retina)</b>	Angst-im-Nacken vor einer Sache, nicht personen-bezogen	Einbuße der Sehfähigkeit des linken und/oder rechten Gesichtsfeldes,	Ödem, Verdickung der Netzhaut (Syndrom: Netzhautablösung) Gesichtsausfälle („homonyme Hemianopsie“, links und/oder rechts)		Wiederaufnahme der Funktion	Vernarbungen und Verschwartungen, Refraktionen (Kurz-/Weitsichtigkeit) d. Verspannung vert. oder horiz. Augenmuskeln (Innervation)
Phase im SBS	<b>2. Peripherie des Auges</b>					
Gewebe	Konfliktinhalt	CA	pCI-A	Krise	pCI-B	Normotonie
<b>Entoderm</b> <b>Azinöser Anteil der Tränendrüsen</b>	Einen Sehbrocken nicht rechtzeitig gesehen zu haben, um etwas zu bekommen/ zu vermeiden (rechts/links)	Zell + Mehrfunktion → Sekretion, tränendes Auge	Zell – Unterfunktion → trockenes Auge	Mehrfunktion	Wiederaufnahme der Funktion	Rezidive: Mukoviszidose der Tränendrüsen

Ektoderm		Tränendrüsen- gänge (Canaliculus lacrimalis )		Gesehen oder nicht gesehen werden wollen	Zell – Überempfindlichkeit	Zell + Schwellung → Stau mit dicker Tränendrüse („Mumps“) Taubheit		Zell + Taubheit	
		-e p i t h e l		Visueller Trennungs- konflikt, Menschen verlieren, während man schläft	Zell – Taubheit	Zell + Schwellung Überempfindlichkeit		Zell + Taubheit	
Ektoderm/Alt-Meso Augenlid		-m o t o r i k		Nicht schnell genug sein, die Augen geöffnet zu haben	progrediente Funktionsminderung → hängendes Augenlid (Ptosis)	Unterfunktion → Muskelschwäche, „Schlaganfall“		Wiederaufnahme der Funktion	
		-l e d e r h a u t		Sich am Auge oder durch das Gesehene besudelt fühlen	Zell + der Moll-,Zeis-, Meibomdrüsen (Schweiß-, Talgdrüsen) Mehrfunktion → Augenbutter	Zell – Schwellung → Gerstenkorn (Hordeolum), Hagelkorn (Chalazion) Unterfunktion → Tränenflüssigkeit läuft über Lidkante		Zell – Wiederaufnahme der Funktion	